

SANGUE OCCULTO




- Prendere il contenitore apposito al Laboratorio o Distretto Sanitario
- Togliere il tappo del flaconcino di raccolta
- Immergere l'asticella collegata al tappo in vari punti del materiale fecale, prelevandone una parte
- Inserire il tappo e conservare in luogo fresco
- Non è necessaria una dieta
- Non RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE il flaconcino

Riconsegnare il flaconcino in Laboratorio il più rapidamente possibile.

Nel caso in cui si debba eseguire l'esame su 3 CAMPIONI conservare i flaconi in frigorifero a una temperatura tra (2-10°C).

SCOTCH TEST O TEST OSSIURI



**N.B. A prelievo ultimato
lavarsi bene le mani**

Richiedere il materiale al laboratorio prima dell'esame

- Lavarsi bene le mani ed eseguire il test al risveglio prima di qualsiasi igiene o defecazione
- Preparare il vetrino fornito dal laboratorio
- Tagliare della stessa misura del vetrino il nastro adesivo
- Applicarlo sullo sfintere anale e comprimere bene per almeno 30 secondi
- Staccare con cautela il nastro e applicarlo sul vetrino

Centro Prelievi Cisanello Edificio 2/b



*Modalità di raccolta
per esami
sulle*

FECI

*Accettazione
050 / 996991*

*Orario
Lunedì — Sabato 7,15 — 10,30*

ATTENZIONE

N.B. Si informa che i contenitori per il SANGUE OCCULTO per il PARASSITOLOGICO e CALPROTECTINA FECALE non sono reperibili nelle comuni FARMACIE; si possono trovare solo ai Centri Prelievo Ospedalieri oppure nei Distretti Socio Sanitari

CALPROTECTINA FECALE Screening su 3 CAMPIONI



D
E
V
I
C
E

ATTENZIONE
Non SVITARE IL TAPPO
CELESTE Altrimenti si incorre
Nell' ANNULLAMENTO DELL'ESAME
Se succede chiedere un
ULTERIORE DEVICE

Chiedere INFORMAZIONI al LABORATORIO

Se si richiedono (3 CAMPIONI) si possono raccogliere le feci TENENDOLE IN FRIGO in contenitore di feci di Laboratorio o Farmacia

Fino a 7 giorni però ATTENZIONE

al 3° giorno di raccolta

TRASFERIRE IL MATERIALE FECALE

nell'apposito DEVICE (o al proprio domicilio se si possiede il DEVICE altrimenti chiedendola direttamente al Laboratorio)

consegnare il campione entro 1 ora oppure se si supera l'ora MANTENERE I CAMPIONI IN GHIACCIO fino alla consegna.

CALPROTECTINA FECALE



D
E
V
I
C
E

ATTENZIONE
Non SVITARE IL TAPPO
CELESTE Altrimenti si incorre
Nell' ANNULLAMENTO DELL'ESAME
Se succede chiedere un
ULTERIORE DEVICE

- Raccogliere le feci in contenitore per feci
(di FARMACIA o di LABORATORIO) >>>

Oppure ritirare il
DEVICE >>>>



contenitore apposito al Laboratorio DEVICE
(a forma di PIPETTA) e conservarlo in frigo

Se siamo in possesso del DEVICE procedere come segue:

- Svitare il tappo del flaconcino DEVICE di raccolta consegnato dal laboratorio
- Immergere l'asticella collegata al tappo in vari punti del materiale fecale, prelevandone una parte ruotando l'asticella togliendo il materiale fecale in eccesso dall'asticella
- Inserire il tappo e conservare il DEVICE in luogo fresco (da 2 a 8 °)
- Non è necessaria una dieta
- Non RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE il flaconcino

N.B. ATTENZIONE se richiesto (1 campione)
UNA VOLTA TRASFERITO NEL DEVICE

deve assolutamente essere consegnato al LABORATORIO entro le 48 ore e se il trasporto al laboratorio supera 1 ora deve essere conservato in GHIACCIO durante il tragitto


N.B. Il MATERIALE FECALE raccolto nel contenitore di FECI è IDONEO ALL'ESAME se mantenuto in FRIGO fino a 7 GIORNI.

PARASSITOLOGICO

Per la raccolta utilizzare un contenitore sterile a bocca larga a forma conica con incluso una paletta a forma di cestello. (riempire completamente il cono di deposito feci presente nel contenitore).

Una volta raccolte le feci chiudere bene il contenitore ed agitarlo in modo vigoroso

Attenzione all'interno
del contenitore si trova un
liquido di fissaggio nocivo:
In caso di richiesta
su 3 CAMPIONI



RACCOGLIERE IL MATERIALE A GIORNI
ALTERNI ove non sia possibile inviare al laboratorio i tre campioni mantenendoli a temperatura ambiente entro 10 gg.

- **COPROCOLTURA**
- **Ag Helicobacter Pylori sulle feci**
- **COPROANTIGENI di protozoi (COPROANTIGENI)**



- Aprire il contenitore svitandolo e con l'apposito cucchiaino ancorato sotto il tappo prelevare per almeno 2 volte una modica quantità di feci (attenzione a non riempire troppo i vasetti poiché il materiale fecale potrebbe fuoriuscire, pena l'annullamento dell'esame).