

Note esplicative riguardanti la prescrizione dei test a seguito dell'ordinanza 66 del 28-12-2021

TIPOLOGIA DI TEST UTILIZZABILI IN REGIONE TOSCANA

TEST	Dove è erogato	destinatari
TEST MOLECOLARE Cod 8838	Drive Through altre strutture Aziendali Strutture accreditate	<ul style="list-style-type: none"> • sintomatici • fine isolamento • positivo al test autosomministrato • contatti stretti ultra fragili, su valutazione medica
ANTIGENICO DI LABORATORIO (3 ^a Generazione) Cod. 8845	Drive Through altre strutture Aziendali strutture accreditate	<ul style="list-style-type: none"> • sintomatici • fine isolamento • positivo al test autosomministrato • contatti stretti ultra fragili, su valutazione medica
ANTIGENICO RAPIDO ad immuno fluorescenza con lettura in microfluidica (3 ^a Generazione) Non esiste al momento codice di prescrizione Difficoltà nell'inserimento su SISPC	necessitano di apparecchio di lettura e sono equiparabili agli antigenici di laboratorio Possibile effettuare: <ul style="list-style-type: none"> • in alcuni presidi Aziendali • in alcuni ospedali • strutture private accreditate 	<ul style="list-style-type: none"> • sintomatici • fine isolamento • positivo al test autosomministrato • contatti stretti ultra fragili, su valutazione medica
ANTIGENICI RAPIDI CON LETTURA IN FLUORESCENZA (2 ^a Generazione) Cod. 8848 – ANTIGENICO RAPIDO (TAMPONE NASO FARINGEO) Cod. 8849 - ANTIGENE RAPIDO (TAMPONE NASALE)	Drive Through Farmacie Medici di Medicina Generale Pediatri di Famiglia	asintomatici: <ul style="list-style-type: none"> • negativi a un test autosomministrato • fine quarantena • fine isolamento • fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo o riammissione scolastica (se asintomatici da almeno 3 giorni) • screening • uso green pass • uso personale
ANTIGENICI RAPIDO IMMUNOCROMATOGRAFICO A FLUSSO LATERALE (1 ^a Generazione)	non sono previsti dalle attuali normative	

TIPOLOGIA DI TAMPONI NELLE VARIE SITUAZIONI CLINICHE

SOGGETTO SINTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> • Test antigenico di laboratorio • Test Molecolare • Test antigenico rapido di 3° generazione
TEST AUTO SOMMINISTRATO POSITIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Test Molecolare • Test antigenico di laboratorio • Test antigenico rapido di 3° generazione
TEST AUTO SOMMINISTRATO NEGATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Test antigenico rapido
FINE ISOLAMENTO asintomatico da 3 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Test Molecolare • Test antigenico di laboratorio • Test antigenico rapido di 3° generazione • Test antigenico rapido
ASINTOMATICO PER SCREENING Uso green pass- uso personale	<ul style="list-style-type: none"> • Test Antigenico rapido
CONTATTI STRETTI	<ul style="list-style-type: none"> • Test antigenico rapido
CONTATTI STRETTI ULTRAFRAGILI	Secondo la valutazione del medico: <ul style="list-style-type: none"> • Test Antigenico rapido • Test molecolare • Test antigenico di laboratorio
Soggetti fragili	<ul style="list-style-type: none"> • Test Antigenico rapido di 3° generazione • Test antigenico di laboratorio

- 1) **un test antigenico positivo non necessita di conferma con test molecolare per la conferma di caso e conseguente diposizione di isolamento**
- 2) un test antigenico rapido negativo in soggetti sintomatici necessita di conferma con altro test a distanza di 2-4 giorni o sulla base della valutazione clinica (presenza e gravità dei sintomi) con un test molecolare o antigenico di laboratorio
- 3) I test autosomministrati poiché non viene registrato in SISPC, non hanno alcun valore ai fini di sanità pubblica e devono quindi essere confermati da una struttura autorizzata, come descritto al punto precedente o con altri test
- 4) Presso le farmacie convenzionate e, successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce rossa o il privato accreditato, possono accedere **unicamente i soggetti asintomatici**, muniti di prescrizione medica e prenotazione, anche su indicazione del MMG/PdF:
 - per fine quarantena
 - per conferma di un test autosomministrato negativo
 - per fine isolamento (se asintomatici da almeno 3 giorni)
 - per fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo o riammissione scolastica (se asintomatici da almeno 3 giorni)
 - contatti stretti ultra fragili
- 5) I soggetti in quarantena/autosorveglianza vengono sottoposti a test solo per la chiusura della quarantena/autosorveglianza stessa. Non è indicato eseguire un tampone per l'apertura della quarantena/autosorveglianza. Solo in caso di particolari esigenze cliniche, su valutazione complessiva del medico, potrà essere prescritto un tampone.

- 6) Le indicazioni di fine quarantena dei contatti prevedono un test antigenico rapido negativo; per il fine isolamento l'ordinanza prevede un test molecolare o antigenico di laboratorio di terza generazione con esito negativo o in caso di fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni), anche un test antigenico di laboratorio o rapido negativo di terza generazione.
- 7) Le farmacie, gli MMG/PdF, e, successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce rossa, e il privato accreditato devono inserire gli esiti nel sistema informativo regionale in tempo reale i test antigenici rapidi (sia positivo che negativo).