



Campagna vaccinazione 2020

Data 04 ottobre 2020
Categoria Professione

Informazioni relative alla campagna vaccinale 2020-2021.

La campagna è rivolta principalmente ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, alle persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza, alle persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale. La vaccinazione è offerta in modo gratuito agli anziani ed alle persone che rientrano nelle categorie a rischio.

La campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2020 – 2021

[b]SITO PER LA PRENOTAZIONE DELLE VACCINAZIONI[/b]

Il sito è stato realizzato da FIMMG Pisa per favorire una campagna ordinata e sicura evitando file ed assembramenti:

[b]Vai al sito: < a href="https://www.mivaccino.com" > www.mivaccino.com </ a > [/b]

[b]COMPOSIZIONE VACCINO ANTI-INFLUENZALE[/b]

Per la stagione 2018-2019 la composizione vaccinale è la seguente:

I vaccini influenzali quadrivalenti sono costituiti, per la stagione 2020 - 2021, da antigeni virali preparati in base ai seguenti ceppi:

Vaccini ottenuti in uova embrionate di pollo:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus;

B/Washington/02/2019-like virus (lineaggio B/Victoria);

e

B/Phuket/3073/2013-like virus (lineaggio B/Yamagata).

Nel caso dei vaccini trivalenti, l'OMS raccomanda l'inserimento del ceppo B/Washington/02/2019-like virus (lineaggio B/Victoria), in aggiunta ai due ceppi di tipo A sopramenzionati.

Vaccini ottenuti su colture cellulari:

A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus;

A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus;

B/Washington/02/2019-like virus (lineaggio B/Victoria);

e

B/Phuket/3073/2013-like virus (lineaggio B/Yamagata).

Nel caso dei vaccini trivalenti, l'OMS raccomanda l'inserimento del ceppo B/Washington/02/2019-like virus (lineaggio B/Victoria), in aggiunta ai due ceppi di tipo A sopramenzionati.

E' possibile utilizzare gli stessi virus modificati in alcune sequenze genomiche come indicato nella raccomandazione del BWP ad hoc influenza Working Group EMA/CHMP/BWP/134670/2020 dell'8 maggio 2020 sopra citata.

[b]SCHEDE TECNICHE

< a href="https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004285_044898_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3" > VAXIGRIP TETRA </ a > vaccino antinfluenzale split tetravalente

< a href="https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004166_031840_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3" > FLUAD </ a > vaccino antinfluenzale adiuvato (soggetti oltre 70 anni)

< a



[PREVENAR 13](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001533_039550_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1I3) vaccino antipnemococcico

[b]RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE[/b]

Le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo dell'influenza per la stagione 2020-2021:

 Circolare Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021

[b]INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO[/b]

Informativa per il consenso alla somministrazione del vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=102>

Modulo per la raccolta del consenso informato nel soggetto adulto:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=100>

Modulo per la raccolta del consenso informato nel minore:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=101>

[b]PREVENZIONE E GESTIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINO[/b]

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=103>

pagine 63-70

[b]FARMACI DI EMERGENZA INDISPENSABILI[/b]

- Adrenalina (1:1000) fiale da 1 ml = 1 mg
- Clorfenamina fiala da 1 ml = 10 mg fiale im – ev
- Idrocortisone fiala da 100 mg, 250 mg, 500mg, im – ev
- Betametasone compresse effervescenti da 0,5 mg (per una azione più rapida utilizzo sub linguale)
- Salbutamolo spray: 100 mcg per erogazione
- Soluzione Fisiologica flaconi da 100, 250 ml

[b]CONTROINDICAZIONI VERE E PRESUNTE ALLE VACCINAZIONI[/b]

[b]Controindicazioni[/b]

- reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose
- reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino

[b]Precauzioni[/b]

- S. di Guillain-Barré entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose
- malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre
- reazione allergica grave al lattice (per i prodotti che contengono lattice nella siringa)

[b]Avvertenza[/b]

- somministrazione di carbamazepina, fenitoina, teofillina e warfarina

[b]False controindicazioni[/b]



- allattamento
- allergia non severa (es. da contatto) al lattice o al tiomersale
- gravidanza
- contemporanea somministrazione di warfarina (coumadin) o aminofillina

[b]LE CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI (ISS):[/b]

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=104>[/url]

[b]MODULISTICA[/b]

Modulo delega per ritiro vaccino:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/delegaritirovaccino.pdf>[/url]

Modulo per registrazione cartacea delle vaccinazioni antinfluenzali prima dell'inserimento su sispc:

[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/Scheda_registrazione_antinfluenzale_2020.pdf[/url]

Modulo registrazione cartacea vaccino antipneumococco prima dell'inserimento su sispc:

[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/Scheda_registrazione_antipneumococco_2020.pdf[/url]

Maschera excel per registrazione su tabellone elettronica delle vaccinazioni prima dell'inserimento su sispc:

[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/MASCHERA_PAZIENTI_E_CATEGORIE_DI_RISCHIO_PER_SISPC.zip[/url]

[b]POSTER[/b]

Poster promozionale numero uno:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/postervaccinodottoressa.pdf>[/url]

Poster promozionale numero due:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/postervaccinodottore.pdf>[/url]