



NICE: si a rivaroxaban in prevenzione secondaria dopo IMA

Data 01 aprile 2015
Categoria Clinica

Secondo il NICE il rivaroxaban può essere usato assieme agli antiaggreganti in prevenzione secondaria dopo un infarto miocardico.

Le nuove linee guida del NICE (National Institute for Health and Care Excellence) sulla prevenzione secondaria dell'infarto del miocardio includono rivaroxaban, in combinazione con clopidogrel e aspirina, o con la sola aspirina, come opzione per prevenire la formazione di coaguli di sangue in soggetti che hanno avuto una sindrome coronarica . Secondo le raccomandazioni del NICE, rivaroxaban può essere utilizzato in combinazione con aspirina più clopidogrel o soltanto con aspirina, per la prevenzione di eventi aterotrombotici in soggetti che hanno avuto una sindrome coronarica acuta con biomarcatori elevati.

Prima di iniziare il trattamento – raccomanda il NICE – i medici dovrebbero valutare attentamente il rischio di sanguinamento, in quanto rivaroxaban è associato a un più alto rischio di sanguinamento rispetto a clopidogrel in associazione con aspirina o alla sola aspirina.

La decisione di iniziare il trattamento deve essere assunta dopo aver discusso con il paziente e averlo informato sui benefici e i rischi di rivaroxaban. Particolare attenzione va posta nel caso di trattamento protratto oltre i 12 mesi, in quanto vi è una esperienza limitata di trattamento con rivaroxaban fino a 24 mesi.

Fonte:AIFA